

調査概要	リベルサスのダイエットに関するアンケート調査
調査対象	リベルサスのダイエットに取り組んだことのある20～50代の男女28名
調査機関	2024年11月12日～2024年11月15日
調査方法	インターネットでのアンケート調査

	年齢	リベルサスの購入方法	服用量	継続期間	効果は感じたか	具体的にどのような効果を感じたか	何キロ減量できたか	副作用は感じたか
1	40代	クリニック（オンライン診療）	3mg	7か月	効果を感じた		3キロ	感じなかった
2	30代	クリニック（オンライン診療）	3mg	5か月	効果を感じた	少量の食事で満足できるようになった	4キロ	感じなかった
3	30代	個人輸入の通販サイト	3mg	3ヶ月	効果を感じた		1キロ	胃の不快感
4	50代	その他	3mg	2ヶ月	とても効果を感じた	少量の食事で満足できるようになった	6キロ	感じなかった
5	30代	クリニック（対面診療）	3mg	3ヶ月	効果を感じた	食欲が抑えられて無理なく食事を減らせた	5キロ	食欲減退・脱力感
6	20代	クリニック（対面診療）	3mg	5か月	とても効果を感じた	見た目がスリムになった		
7	30代	クリニック（対面診療）	3mg	4ヶ月	効果を感じた	食欲が抑えられて無理なく食事を減らせた	4キロ	
8	20代	クリニック（オンライン診療）	3mg	2ヶ月	とても効果を感じた	少量の食事で満足できるようになった	2キロ	
9	30代	クリニック（オンライン診療）	7mg	1ヶ月未満	服用前と変わらなかった	その他		下痢・嘔吐・胃の不快感・めまい・動悸
10	30代	個人輸入の通販サイト	7mg	3ヶ月	効果を感じた	食欲が抑えられて無理なく食事を減らせた	4キロ	嘔吐・めまい・脱力感
11	20代	クリニック（オンライン診療）	3mg	1ヶ月	効果を感じた	少量の食事で満足できるようになった	2キロ	感じなかった
12	30代	個人輸入の通販サイト	3mg	3ヶ月	効果を感じた	体重が減った	5キロ	感じなかった
13	20代	クリニック（対面診療）	7mg	3ヶ月	とても効果を感じた	少量の食事で満足できるようになった	4キロ	食欲減退
14	40代	クリニック（対面診療）	3mg	3ヶ月	効果を感じた	食欲が抑えられて無理なく食事を減らせた		
15	50代	クリニック（オンライン診療）	3mg	3ヶ月	効果を感じた	食欲が抑えられて無理なく食事を減らせた	5キロ	
16	30代	クリニック（オンライン診療）	3mg	3ヶ月	服用前と変わらなかった			脱力感
17	20代	クリニック（オンライン診療）	7mg	8ヶ月	とても効果を感じた	少量の食事で満足できるようになった	5キロ	胃の不快感
18	40代	個人輸入の通販サイト	3mg	1ヶ月未満	服用前と変わらなかった			
19	40代	クリニック（オンライン診療）	3mg	1ヶ月	効果を感じた	体重が減った	3キロ	
20	20代	個人輸入の通販サイト	14mg	4ヶ月	とても効果を感じた	食欲が抑えられて無理なく食事を減らせた	6キロ	嘔吐
21	30代	クリニック（オンライン診療）	3mg	1ヶ月未満	効果を感じた	食欲が抑えられて無理なく食事を減らせた	2キロ	胃の不快感・めまい
22	30代	クリニック（オンライン診療）	3mg	1年以上	効果を感じた	食欲が抑えられて無理なく食事を減らせた	5キロ	動悸・頭痛・寒気
23	40代	クリニック（対面診療）	3mg	3ヶ月	効果を感じた	体重が減った	3キロ	
24	30代	クリニック（オンライン診療）	3mg	5か月	効果を感じた	少量の食事で満足できるようになった	6キロ	めまい
25	20代	個人輸入の通販サイト	7mg	6ヶ月	服用前と変わらなかった			
26	40代	クリニック（対面診療）	3mg	3ヶ月	効果を感じた	少量の食事で満足できるようになった	5キロ	
27	50代	クリニック（対面診療）	7mg	3年以上	服用前と変わらなかった			下痢・嘔吐・胃の不快感・めまい・動悸
28	20代	クリニック（オンライン診療）	3mg	2ヶ月	効果を感じた	体重が減った	5キロ	